


Subsérie *Erythropus ad int*

5 a) Chapeau à couleurs ± sombres, brun olivâtre, brun sombre, brun rougeâtre, brun noirâtre, brun orangé. .... 6

b) Chapeau autrement coloré, à couleurs ± vives. .... 7

6 a) Chair bleuisant rapidement et ± intensément à l'air. Chapeau 5-18 (20) cm, feutre<sup>à veloute</sup>, brun ± sombre, brun rougeâtre, brun noirâtre, brun-olive, brun orangé sale, brun-fauve, parfois avec des zones jaunâtres, jaune orangé, un peu rougeâtre :



Tubes jaunes à un peu verdâtres, bleuissants. Pores presque orangés à rouge sang, bleuissant fortement au toucher. Stipe (4) 5-15 (18) x 2-6 (7) cm, jaune à orange ou rouge, base ± brune, avec une fine et remarquable ponctuation rouge. Chair jaunâtre à jaune dans le chapeau et sous les tubes, rouge très variable dans le stipe. Iode 0. Spores (13) 14-17,5 (20) x 5-6,7 (8) µm. Q moy. 2,65. Hyphes de l'épicutis x 2,5-8 (10) µm. Fréquent sous feuillus acidophile et *Pinus*, parfois sous *Abies* ou *Picea*. [Ales: 179, Fr. OM: 243-250, OM 1: 23, LE: 47, CSH 73 (1): 10 - ICO: Ales 21, Bo 39, CD 1681, BK 9, Eng (2) 22, Gli 241, Kall 14 pl 38 f.68, Md 61, Sing II pl 14: 5-11]

(Exs. 8810235 AE...)

***B. erythropus* Persoon 1795: Fr. var *erythropus***  
(= *B. luridiformis* ss auct)

Le chapeau est parfois anormalement jaune (carpophores ayant poussé à l'abri de la lumière) ou teinté de rouge (par très forte humidité). Le stipe présente parfois, en haut, une amorce de réseau grossier. Possibles intermédiaires avec *B. caucasicus* (Série *Satanas* p. 105) lui-même espèce critique.

b) Chair immuable ou bleuisant lentement (après une ? heure) et légèrement dans le chapeau et le haut du stipe. Chapeau brun sombre, brun rougeâtre, marron. Sous *Quercus* et *Fagus* en Grande-Bretagne, [Mygst 10 (2): 80 - ICO: Mygst 10 (2): 81]

(Exs. 990829/5 GL)

***B. erythropus* fo. *immutatus* Pegler & Hills 1996 ad int.**  
(= *B. luridiformis* var. *immutatus* Pegler & Hills 1996)

7 a) Chapeau jaune ou jaune puis orangé rougeâtre à orangé brunâtre .... 8

b) Chapeau rose, rose-rouge, rose violacé, rouge ou d'abord rose-rouge à ± rouge, puis mastiticide livide à gris sale verdâtre .... 9

8 a) Chapeau d'abord jaune, puis orangé-rougeâtre, orangé-brunâtre, et jaunâtre à jaune à la marge, puis un peu brunâtre ; chez les jeunes le chapeau se macule à la pression :

Tubes jaunes, bleuisant à la coupe. Pores d'aspect orangé, orangé jaunâtre, jaune à la marge, rougissant avec l'âge, bleuisant à la pression. Stipe généralement un peu plus long que chez *B. erythropus*, claviforme, finement pointillé et piqué çà et là de rouge orangé à rouge vineux, sur un fond jaune, base à duvet brun. Chair jaune, bleuisant à la coupe. Sous feuillus divers, surtout en forêts thermophiles. Spores (12) 13-17 (20) x (4) 5-6,5 (7) µm. Q = 2,6-2,9. Très rare. [CM 30: 1, QuéIFM: 422, Myctx 56: 115 - ICO: Eng (2) 23, FRIC 9 pl 68b; Pl. 5-B]

(Exs. 971015/1 GL, 9910235 AE)

***B. erythropus* ssp. *discolor* (Quélet) Dermek, Kuthan & Singer 1976**  
ss. Dermek et al. nec Quélet

Voir nos remarques à *B. queletii* var. *discolor* (3 b). Dans le cas où les deux interprétations bien carac-